

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 188
du 24 janvier 1991

- :=====:
- : - Météo en 1990 à BASTIA et AJACCIO :
- : - Dès l'allongement des bourgeons à bois, pensez à la :
- : cloque du pêcher :
- : - Les processionnaires du pin sont déjà sorties :
- : - Cultures maraîchères = Conseils avant remise en place :
- : de la culture :
- :=====:

1990 a été également marqué par un été chaud et sec. Le déficit hydrique reste important essentiellement sur BASTIA. Les pluies d'automne très abondantes et la neige de décembre ont toutefois permis de reconstituer partiellement les réserves d'eau.

La pluviométrie totale a atteint en 1990

* 558 mm sur BASTIA (moyenne des précipitations sur les 30 dernières années = 740 mm)

* 796 mm sur AJACCIO (moyenne des précipitations sur les 30 dernières années = 660 mm)

Les températures hivernales sont restées élevées - (par exemple à BASTIA PORETTA aucun jour de gelée ni aucun jour de neige n'a été enregistré).

PECHER

**** Cloque du pêcher**

Dès l'allongement des bourgeons à bois (extrémités des rameaux) vous pouvez utiliser une pulvérisation **cuprique** à raison de 500 g de cuivre métal /hl.

--> Attention certaines variétés de nectarines (ex Armking) sont sensibles au cuivre.

--> Intervenez 8 à 10 jours après la taille.

.../...

P2

Stades bourgeons à bois



Au centre des écailles, on peut apercevoir la pointe verte ou rougeâtre de la première feuille en regardant par dessus

B

Début de sensibilité

A partir du stade B :

Employez uniquement des fongicides de synthèse.

captane	N S
ferbame	FERBAMATE, SEPIFER
thirame	N S
zirame	N S

Ces produits sont incompatibles avec les bouillies cupriques .

PINS

Les processionnaires du pin commencent déjà à descendre le long du tronc des arbres pour aller se nymphoser dans le sol.

Il est trop tard pour réaliser un traitement. Il faudra y penser en septembre ou octobre prochain.

Actuellement vous pouvez encore :

- tirer au fusil dans les nids d'hiver avec du petit plomb
- ou couper les nids pour les brûler ensuite. Attention, protégez vous bien, les poils sont urticants.
- enduire de glu la base des troncs sur une hauteur de 30 cm. Les chenilles en descendant viendront s'y agglutiner et mourir, ramasser les rescapées et les brûler.

CULTURES MARAICHIERES

Il convient de réaliser un vide sanitaire dans les serres susceptibles de recevoir des cultures de printemps, notamment les tomates dont les repiquages s'effectuent traditionnellement vers le 15/20 février dans notre région.


>> - **Eliminer** tous les débris de culture, les brûler ou les recouvrir d'une bache plastique ou les enterrer après avoir jeté quelques poignées de sulfate d'ammoniaque

>> - **Desherber** soigneusement à l'intérieur et autour des serres.


>> - **Désinfecter** les structures à l'eau de javel à 5% à 48% chlorométrique; à l'hortinet, à l'hortiseptyl ou à tout autre désinfectant efficace.

Utiliser le jet à forte pression et beaucoup d'eau :
3000 l/ha.


AJACCIO 1990 Températures



AJACCIO 1990 Précipitations



BASTIA 1990 Températures



BASTIA 1990 Précipitations

